

の予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

ワクチン接種が済んだら
チェックをいれましょう!



生まれ

ワクチン名		接種回数	0歳	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月	7ヵ月	8ヵ月	9ヵ月	10ヵ月	11ヵ月	1歳	1ヵ月	2ヵ月	3ヵ月	4ヵ月	5ヵ月	6ヵ月	2歳	3歳		
Hib(ヒブ) 定期 不活化 皮下注射		4回				①	②	③															④		
①-②-③はそれぞれ27~56日(4~8週)あける ③-④は7~13ヵ月あける																									
肺炎球菌 定期 不活化 皮下注射		4回				①	②	③																④	
①-②-③はそれぞれ27日(4週)以上あける ③-④は60日(2ヵ月)以上あけて1~1歳3ヵ月で接種																									
B型肝炎 定期 不活化 皮下注射		3回				①	②				③														
①-②は27日(4週)以上あける ①-③は139日(20週)以上あける																									
ロタウイルス 任意 生 経口	1価	2回				①	②																		
	5価	3回				①	②	③																	
②は24週までに完了 ③は32週までに完了 生後6週から接種可能、①は8~15週未満を推奨 ①-②は4週以上あけ、計2回接種 生後6週から接種可能、①は8~15週未満を推奨 ①-②-③は4週以上あけ、計3回接種																									
4種混合(DPT-IPV) 定期 不活化 皮下注射		4回				①	②				③													④	
①-②-③はそれぞれ20~56日(3~8週)あける ③-④は6ヵ月以上あけ、標準的には③終了後12~18ヵ月の間に接種 11歳~13歳未満に、追加接種として、2種混合ワクチンを1回接種																									
BCG 定期 生 経皮スタンプ		1回								①															
1歳になったら早めに接種																									
MR(麻しん風しん混合) 定期 生 皮下注射		2回																						①	
小学校入学の前年(幼稚園・保育所の最長児)に、追加接種として2回目を接種																									
水痘(みずぼうそう) 定期 生 皮下注射		2回																						①	②
1歳になったら早めに接種 ①は生後12~15ヵ月で接種 ①-②は3ヵ月以上あける																									
おたふくかぜ 任意 生 皮下注射		2回																						①	
小学校入学の前年(幼稚園・保育所の最長児)に、追加接種として2回目を接種(小児科学会として推奨)																									
日本脳炎 定期 不活化 皮下注射		4回																							①
生後6ヵ月から接種可能、標準的には3歳から、合計4回接種します。																									
インフルエンザ 任意 不活化 皮下注射		毎秋																							
生後6ヵ月から接種可能、①-②は4週(2-4週)あける 1年目 秋ごろ ① ② 2年目 秋ごろ ① ② 3年目 秋ごろ ① ②																									

実際の接種にあたりましては、主治医の先生にご相談ください。

日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2016年10月1日版より作成

定期 定期接種：法律に基づいて市町村が主体となって実施します(公費、一部負担あり)。	不活化 不活化ワクチン	定期接種の推奨期間	定期接種の接種可能な期間
任意 任意接種：希望者が各自で受けます(自己負担、自治体によっては助成金が出る場所もあり)。	生 生ワクチン	任意接種の推奨期間	任意接種の接種可能な期間

